

腹部エコー・内視鏡検査（胃・大腸カメラ）に関する説明書

高血圧や糖尿病の治療中の方、抗血栓薬（抗凝固剤・抗血小板剤・血液サラサラとも呼ばれています）を内服中の方を対象に、腹部エコー（腹部超音波）や内視鏡検査を受ける際の注意事項をまとめましたので以下をお守りください。

【高血圧で降圧剤を内服中の方】

高血圧で降圧剤（血圧の薬）を内服中の方は、朝のお薬を必ず内服してきてください。

降圧剤内服の時間

- 午前に検査の方：午前6時までに内服
- 昼、午後または夕方に検査の方：午前8時までに内服

※検査の時間帯によって降圧剤の内服時間が変わりますのでご注意ください。

※検査直前の血圧が高い場合には、安全管理上の問題で検査を中止することがあります。

【抗血栓薬（抗凝固剤・抗血小板剤・血液サラサラ）を内服中の方】

これまでの病気を再発させないまたは、病気を起こさないために、あなたは抗血栓薬を内服しています。検査当日は必ず内服の上、クリニックにお越しください。ご自身の判断で抗血栓薬の内服を中止されないようお願いいたします。抗血栓薬を内服しないでご来院された場合には、安全管理上の理由で当日の検査を受けることができません。日程を延期いたします。

※2種類以上の抗血栓薬を内服中の方は、病理検査は行いません。病理検査が必要な場合には、検査後に高次医療機関をご紹介します。

【糖尿病治療中（内服薬またはインスリン等の注射）の方】

- 検査の当日は糖尿病薬の内服はしないでください。
- 検査の当日はインスリン等の注射をしないでください。

もし検査当日に糖尿病薬を内服してしまった場合や、インスリン注射を打ってしまった場合は安全管理上、検査を受けていただくことはできませんので、すみやかにいつもの朝食をお召し上がりください。その場合は午前8時30分にクリニックにお電話でその旨のご連絡をお願いします。

私は、上記内容について説明を受け理解しました

_____年_____月_____日

本人または

代理人署名：

（続柄：_____）